Dr. Schumacher

weita

Penser plus loin.
Agir durablement.

APERÇU DE LA GAMME DÉSINFECTION





LA SOCIÉTÉ SUISSE WEITA AG est un fournisseur de premier plan de consommables et de prestations connexes au service de l'industrie, du commerce de gros de la restauration, de l'artisanat, du secteur du nettoyage et du médical ainsi que des services publics.
Nous facilitons l'approvisionnement de consommables en jouant le rôle d'interface entre producteurs et clients ; et d'interlocuteur unique pour tous vos besoins particuliers. Nous collaborons avec différents experts et partenaires fiables et les sélectionnons selon des critères élevés. Ce processus continu est mené avec le plus grand soin par nos experts.

DEPUIS 2003 les entreprises Dr. Schumacher GmbH et WEITA AG entretiennent une collaboration fructueuse : Dr. Schumacher est un fabriquant innovant de produits de désinfection et d'hygiène et WEITA est son partenaire commercial en Suisse.

DR. SCHUMACHER emploie 1 850 collaborateurs répartis sur neuf sites à travers le monde. Le siège de Dr. Schumacher GmbH ainsi que le site de production de désinfectants liquides se trouvent à Malsfeld-Beiseförth dans la Hesse en Allemagne. Le site de production de Lubañ en Pologne est responsable de la fabrication de lingettes sèches et imprégnées.
Il existe d'autres filiales et représentations commerciales en Autriche, en Suisse, au Portugal, en Turquie, en Jordanie et en Inde.
Un réseau de partenaires commerciaux actifs dans près de 70 pays souligne l'orientation internationale de l'entreprise.

« Dr. Schumacher et Weita : un partenariat bénéficiant d'un label qualité »




Dr.
Schumacher

Niveau d'hygiène Dr. Schumacher

Un code couleur pour identifier tous les niveaux d'efficacité contre les virus

Les virus étaient reconnus comme des agents pathogènes susceptibles de déclencher des maladies graves, notamment chez les personnes âgées et immunodéprimées, bien avant la survenue du nouveau type de coronavirus SARS-CoV-2. Environ 85 % des épidémies nosocomiales dans les établissements de santé et de soins sont causées par des agents pathogènes viraux[1].

Les virus peuvent être classés en deux catégories en fonction de leur structure : les virus avec et sans enveloppe. Les virus à enveloppe tels que les coronavirus ou les virus du SIDA et de la grippe offrent une bonne surface d'attaque aux substances chimiques et sont donc faciles à inactiver. Les virus sans enveloppe, comme les norovirus ou les virus coxsackie, sont plus stables face aux désinfectants. Les norovirus, rotavirus et adénovirus non enveloppés sont notamment souvent responsables d'épidémies. 74 % de toutes les épidémies nosocomiales sont causées par les seuls norovirus[1]. Ces virus sont plus stables que les virus enveloppés, mais pas aussi stables que certains autres virus non enveloppés.

Les différentes résistances des virus correspondent à trois spectres d'action des désinfectants, testés selon les méthodes de RKI/DVV ou selon la norme DIN EN : virucide limité, virucide limité PLUS et virucide.

Le codage couleur des niveaux d'hygiène **PREVENT :: PRESERVE :: PROTECT** correspond au trois spectres d'action et permet aux utilisateurs de voir en un simple coup d'œil l'efficacité respective contre les virus de la plupart des produits Dr. Schumacher.

Pour en savoir plus :
www.schumacher-online.com/de/einfach

Source :
[1] Robert Koch-Institut. Nosokomiale Ausbrüche. Date de publication : 07.12.2016. https://bit.ly/2VfepMo

PREVENT LEVEL

Spectre d'action :
bactéricide, levuricide, **virucide limité***

Les virus enveloppés sont entourés d'une enveloppe de nature lipidique. L'enveloppe virale constitue un point d'attaque et peut être facilement détruite par les désinfectants. Un spectre d'action virucide limité suffit dans ce cas. En milieu hospitalier, il convient de lutter contre un grand nombre de ces virus enveloppés.
Virus pertinents éliminés par le produit : VHB, VHC et VIH, coronavirus et virus de la grippe.

PRESERVE LEVEL

Spectre d'action :
bactéricide, levuricide, **virucide limité PLUS***

Les virus non enveloppés sont généralement plus stables que les virus enveloppés. Au sein de ce groupe, cependant, certains virus sont moins résistants que d'autres. En milieu hospitalier, les virus qu'il convient d'éliminer sont les norovirus, rotavirus et adénovirus, responsables d'un grand nombre d'épidémies. Dans la mesure où l'action virucide n'est pas requise ici et qu'elle est en principe plus difficile à obtenir, nous avons introduit le spectre d'activité virucide PLUS limité.
Virus pertinents éliminés par le produit : tous les virus enveloppés ainsi que les norovirus, rotavirus et adénovirus.

PROTECT LEVEL

Spectre d'action :
bactéricide, levuricide, **virucide***

Pour les virus non enveloppés présentant une résistance forte, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des agents hautement efficaces, des concentrations de désinfectant plus élevées et des temps plus longs. Le spectre d'action des produits contre ces virus correspond à la catégorie virucide et comprend une activité virucide limitée et une activité virucide limitée PLUS.
Virus pertinents éliminés par le produit : écho-virus, virus coxsackie-, rhinovirus, picornavirus et papillomavirus.

* **Virucide limité :** tous les virus enveloppés
Virucide limité PLUS : tous les virus enveloppés ainsi que les norovirus, rotavirus et adénovirus
Virucide : tous les virus enveloppés et non enveloppés

En fonction de l'application, d'autres spectres d'action (sporicide, fongicide, tuberculocide, mycobactéricide) peuvent être pris en compte dans la recommandation d'application **Prevent :: Preserve :: Protect**.

DÉSINFECTION DES MAINS ET DE LA PEAU

INFORMATIONS GÉNÉRALES					
Désignation	**ASEPTOMAN® PERFUME FREE** (remplace Aseptoman PUR)	**ASEPTOMAN® MED** (remplace Aseptoman)	**ASEPTOMAN® FORTE** (remplace Aseptoman PLUS)	**ASEPTOMAN® GEL** (remplace Aseptoman GEL)	**ASEPTODERM®** (remplace Aseptoskin)
Image					
Niveau d'hygiène	**PREVENT LEVEL**	**PRESERVE LEVEL**	**PROTECT LEVEL**	**PROTECT LEVEL**	N/A
N° Art. WEITA	00-4030P-0015E6 (150 ml) 00-4030P-005E6 (500 ml) 00-4030P-010E6 (1 l)	00-4570P-0015 (150 ml) 00-4570P-005 (500 ml) 00-4570P-010 (1 l) 00-4570P-050 (5 l)	00-4850P-0015 (150 ml) 00-4850P-005 (500 ml) 00-4850P-010 (1 l) 00-4850P-050 (5 l)	00-409-0015 (150 ml) 00-409-005 (500 ml) 00-409-010 (1 l)	00-501-0025E6 (250 ml) 00-501-010E6 (1 l)
Composition	100 g de solution contient : 63,14 g de 2-propanol	100 g de solution contient : 65 g d'éthanol	100 g de solution contient : 85 g d'éthanol	100 g de solution contient : 80,8 g d'éthanol	100 g de solution contient : 63,1 g de 2-propanol, parfums
Statut du produit	Biocide	Biocide	Biocide	Biocide	Biocide
SPECTRE ET TEMPS D'ACTION					
Désinfection hygiénique des mains selon EN 1500	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	-
Désinfection chirurgicale des mains selon EN 12791	✓ (1,5 min)	✓ (2 min)	✓ (1,5 min)	✓ (1,5 min)	-
Désinfection de la peau EN 12791	-	-	-	-	✓ (1,5 min)
Action virucide limitée EN 14476 (virus enveloppés, par ex. HBV, HCV, grippe)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	-	-	✓ (15 s.)
Efficace contre les coronavirus EN 14476	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)
Action virucide limitée PLUS EN 14476 (virus enveloppés + rotavirus, adénovirus et norovirus)	-	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ Adénovirus : 1 min ; Norovirus : 15 s.	-

Efficace contre les rotavirus EN 14476	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	-	-
Virucide EN 14476 (virus enveloppés et non enveloppés)	-	-	✓ (1 min.)	✓ (1 min)	-
Efficace contre les poliovirus EN 14476	-	-	✓ (1 min.)	✓ (1 min)	-
Bactéricide EN 13727	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)	✓ (15 s.)
Levuricide EN 13624	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (15 s.)	✓ (5 s.)	✓ (15 s.)
Tuberculocide EN 14348	✓ (15 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)
Fongicide EN 13624	-	-	✓ faible charge : 1,5 min ; forte charge : 2 min	-	-
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT					
Relipidant	✓	✓	✓	✓	N/A
Sans parfum	✓	✓	✓	✓	N/A
Sans colorant	✓	✓	✓	✓	✓
UTILISATION					
Domaines d'application	Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.	Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.	Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.	Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.	Désinfection de la peau avant les opérations, les incisions, les ponctions et les injections.
Secteurs où l'utilisation est recommandée					
Où exactement ?	Salle d'attente, salle de consultation, hall d'entrée, etc.	Salle d'attente, salle de consultation, hall d'entrée, etc.	Unité de soins intensifs et chambre d'isolement	Unité de soins intensifs et chambre d'isolement	Salle de consultation et salle d'opération

DÉSINFECTION DES SURFACES

Dr. Schumacher

INFORMATIONS GÉNÉRALES				
Désignation	**DESCOSEPT SPEZIAL**	**DESCOSEPT SENSITIVE**	**CLEANISEPT WIPES MAXI**	**DESCOSEPT SENSITIVE WIPES**
Image				
Niveau d'hygiène	**PREVENT LEVEL**	**PRESERVE LEVEL**	**PREVENT LEVEL**	**PRESERVE LEVEL**
N° Art. WEITA	00-208-010E5 (1 l) 00-208-050E5 (5 l)	00-323DS-005E5 (500 ml) 00-323DS-0075-02E5 (750 ml) 00-323DS-010E5 (1 l) 00-323DS-050E5 (5 l) 00-323DS-100E5 (10 l)	00-208-T100E5 (sachet de 100 lingettes)	00-323DS-T060E5 (sachet de 60 lingettes)
Composition	100 g de solution contient : 0,50 g de chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium, 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium	100 g de solution contient : 45 g d'éthanol	100 g de solution contient : 0,50 g de chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium, 0,25 g de chlorure de didécyldiméthylammonium	100 g de solution contient : 45 g d'éthanol
Taille de la lingette	-	-	20 x 22 cm	20 x 22 cm
Statut du produit	Dispositif médical classe IIa selon MDD/MDR	Dispositif médical classe IIa selon MDD/MDR	Dispositif médical classe IIa selon MDD/MDR	Dispositif médical classe IIa selon MDD/MDR
SPECTRE ET TEMPS D'ACTION				
Conseil d'utilisation pour la désinfection des surfaces : bactéricide, levuricide EN 16615	✓ (1 min)	✓ (2 min)	✓ (1 min)	✓ (2 min)
Action virucide limitée EN 14476 (virus enveloppés, par ex. HBV, HCV, grippe)	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Efficace contre les coronavirus EN 14476	✓ (1 min)	✓ (30 s.)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Action virucide limitée PLUS EN 14476 (virus enveloppés + rotavirus, adénovirus et norovirus)	-	✓ (3 min)	-	✓ (3 min)
Efficace contre les rotavirus EN 14476	✓ (30 s.)	-	✓ (30 s.)	✓ (30 s.)

Efficace contre les adénovirus EN 14476	-	✓ (3 min)	-	✓ (3 min)
Efficace contre les norovirus EN 14476	-	faible charge : 1 min forte charge : 3 min	-	faible charge : 1 min forte charge : 30 s
Virucide EN 14476 (virus enveloppés et non enveloppés)	-	-	-	-
Efficace contre les poliovirus EN 14476	-	-	-	-
Efficace contre les papovirus/SV40 EN 14476	✓ (2 min)	-	✓ (2 min)	-
Bactéricide EN 13727	✓ (1 min)	✓ (1 min)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Levuricide EN 13624	-	✓ (1 min)	✓ (1 min)	✓ (1 min)
Tuberculocide EN 14348	-	✓ forte charge : 1 min ; faible charge : 30 s.	-	✓ (30 s.)
Fongicide EN 13624	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT				
À base d'alcool	-	✓	-	✓
Sans alcool	✓	-	✓	-
Sans parfum	✓	✓	✓	✓
UTILISATION				
Domaines d'application	Désinfection rapide et nettoyage du matériel médical sensible à l'alcool et de toutes les surfaces. Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs et sensibles à l'alcool.	Désinfection rapide et nettoyage du matériel médical et de toutes les surfaces, principalement dans l'environnement proche des patients. Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs, en particulier leurs surfaces sensibles.	Désinfection rapide et nettoyage du matériel médical sensible à l'alcool et de toutes les surfaces. Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs sensibles à l'alcool.	Désinfection rapide et nettoyage du matériel médical et de toutes les surfaces, principalement l'environnemen proche des patients. Désinfection rapide et nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs, en particulier leurs surfaces sensibles.
Secteurs où l'utilisation est recommandée				
Où exactement ?	Salle d'attente, salle de consultation, chambre du patient	Salle de consultation, chambre du patient, secteur alimentaire et cuisine, etc.	Salle d'attente, salle de consultation, chambre du patient	Salle de consultation, chambre du patient, secteur alimentaire et cuisine, etc.

DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS

Dr. Schumacher

INFORMATIONS GÉNÉRALES		
Désignation	**PERFEKTAN® TB**	**DESCOTON FORTE**
Image		
Niveau d'hygiène	**PREVENT LEVEL**	**PROTECT LEVEL**
N° Art. WEITA	00-122-010E5 (1 l) 00-122-020E5 (2 l) 00-122-050E5 (5 l)	00-101-010 (1 l) 00-101-050 (5 l)
Composition	100 g de solution contiennent : 3,75 g de diacétate de cocospropylenediaminguanidinium, 5,63 g propionate de didecyloxethyl méthylammonium. Contient : 5 -15 % tensioactifs non ioniques, désinfectant, parfums.	100 g de solution contiennent : 7,6 g méthanal, 4,5 g glutaral, contient : 5-15 % tensioactifs non ioniques, parfums.
Statut du produit	Dispositif médical classe IIb selon MDD/MDR	Dispositif médical classe IIb selon MDD/MDR
SPECTRE ET TEMPS D'ACTION		
Conseil d'utilisation pour la désinfection des instruments : bactéricide, levuricide VAH / EN	3 % - 15 min (forte charge) 2 % - 30 min (forte charge) 1 % - 60 min (forte charge)	3 % - 15 min (forte charge) 3 % - 30 min (forte charge) 2 % - 60 min (forte charge)
Conseil d'utilisation pour la désinfection des instruments : (tuberculocide)	-	3 % - 30 min (forte charge) 2 % - 60 min (forte charge)
Recommandation pour le pré-nettoyage désinfectant en cas d'utilisation d'un bain à ultrasons : bactéricide, levuricide DGHM/VAH	forte charge : 1 % - 5 min	-
Désinfection d'instruments en cas d'épidémie selon IfSG	-	5 % - 60 min 3 % - 120 min
Action virucide limitée RKI/DVV (y compris HBV/HIV/HCV)	2 % - 15 min 1 % - 30 min	1 % - 15 min
Efficace contre les adénovirus EN 14476	-	0,5 % - 60 min
Efficace contre les norovirus EN 14476	-	-

Efficace contre les norovirus EN 17111	-	-
Virucide EN 14476 & EN 17111 (virus enveloppés et non enveloppés)	-	2 % - 60 min
Efficace contre les poliovirus RKI/DVV	-	4 % - 30 min 2 % - 60 min
Efficace contre les poliovirus EN 14476	-	faible charge : 2 % - 60 min
Efficace contre les papovavirus/polyomavirus RKI/DVV	2 % - 30 min 1 % - 60 min	4 % - 30 min 1 % - 60 min
Efficace contre les virus de l'hépatite A RKI/DVV	-	6 % - 120 min
Bactéricide EN 13727	faible charge : 0,25 % - 5 min forte charge : 1,5 % - 5 min ; 1 % - 15 min	-
Bactéricide EN 14561	faible charge : 0,25 % - 5 min forte charge : 2 % - 5 min ; 1 % - 15 min	-
Bactéricide EN 1276	faible charge : 0,25 % - 5 min	-
Levuricide (Candida albicans) EN 13624	faible charge : 0,50 % - 5 min forte charge : 1 % - 15 min	faible charge : 3 % - 15 min ; 2 % - 30 min ; 2 % - 60 min
Levuricide (Candida albicans) EN 14562	2 % - 15 min 1 % - 30 min	-
Levuricide (Candida albicans) EN 1650	faible charge : 0,25 % - 5 min	-
Tuberculocide (M. terrae) EN 14348	faible charge : 5 % - 60 min	forte charge : 3 % - 30 min ; 2 % - 60 min
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES		
Faible odeur	✓	-
Respectueux du matériel	✓	✓
Protection contre la corrosion	✓	✓
UTILISATION		
Domaines d'application	Idéal pour le pré-nettoyage désinfectant non fixant des instruments et des instruments dentaires. Convient à une utilisation dans un bain à ultrasons.	Pour la désinfection manuelle finale des instruments médicaux, endoscopes flexibles et rigides.
Secteurs où l'utilisation est recommandée	HEALTHCARE	HEALTHCARE
Où exactement ?	Hôpitaux (OP), cabinets médicaux	Hôpitaux (OP), cabinets médicaux

weita

Penser plus loin.
Agir durablement.

« Pour nous, la durabilité est synonyme de partenariats durables et fiables. Nous aimons le dialogue et pensons que notre valeur ajoutée ne se limite pas à proposer des produits durables mais consiste à créer et à mettre en œuvre avec nos clients des concepts globaux tournés vers l'avenir et économes en ressources. »









Weita AG · Nordring 2 · CH-4147 Aesch · T +41 61 706 66 00 · info@weita.ch · www.weita.ch